


**РЕЛАТОКС®**

БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А

# БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

Рекомендованные дозы  
и расчет дозировки



# ШПРИЦЫ ДЛЯ БОТУЛИНОТЕРАПИИ И РАСЧЕТ ДОЗИРОВКИ

**РЕЛАТОКС®**  
БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А

В косметологии для введения препарата РЕЛАТОКС® используются инсулиновые шприцы с интегрированной (встроенной в шприц) иглой на U40 и U100.

Стандартное разведение: 50 ЕД – в 1 мл NaCl, 100 ЕД – в 2 мл NaCl:

<b>U40</b>	1 мл	40 делений		1 деление = 1,25 ЕД
<b>U100</b>	1 мл	50 делений		1 деление = 1 ЕД ✓
<b>U100</b>	0,5 мл	50 делений		1 деление = 0,5 ЕД

✓ наиболее удобное сочетание типа шприца и пропорции разведения

**Производитель**  
АО «НПО «Микроген»,  
Россия, 115088, г. Москва,  
ул. 1-я Дубровская, д. 15, стр. 2  
тел.: +7 495 790 77 73

**МИКРОГЕН**

Национальный производитель  
иммунобиологических препаратов  
[www.microgen.ru](http://www.microgen.ru)

Лицензия № Л012-00102-77/00010419

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

# РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОЗЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ<sup>1,2</sup>

**РЕЛАТОКС®**  
БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А

1. Инструкция по применению № ЛП-001593-040422.
2. Не рекомендуется вводить максимальные дозы во все зоны коррекции.

**m. procerus**  
(мышца гордецов)  
1 точка  
2,5–7,5 ЕД

**m. corrugator supercilii**  
(мышца,  
сморщивающая бровь)  
1 точка (с каждой стороны лица)  
2,5–7,5 ЕД

**не более 25 ЕД в эту область**

**m. nasalis**  
(«кроличьи морщины»)  
1 точка  
2,5 ЕД с каждой стороны

**m. depressor anguli oris**  
(мышца, опускающая  
угол рта)  
1 точка  
2,5 ЕД с каждой стороны


**m. frontalis (морщины лба)**  
5–10 точек  
1,25–2,5 ЕД (не более 20 ЕД  
для всей зоны)

**m. orbicularis oculi**  
(«гусиные лапки»)  
2–4 точки  
2–2,5 ЕД с каждой стороны  
(не более 25 ЕД на одну  
сторону лица)

**m. nasalis (крыльчатая часть)**  
1 точка  
2,5 ЕД с каждой стороны

**периоральные морщины**  
4–6 точек (на всю область)  
1,25 ЕД

**m. mentalis**  
(зона подбородка)  
1 точка  
2,5 ЕД



# КОРРЕКЦИЯ ТЯЖЕЙ ПЛАТИЗМЫ

**РЕЛАТОКС®**  
БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А

Количество точек: **от 4 до 12**

---

Расстояние между точками:  
**около 2–3 см** по вертикальной  
линии тяжа

---

В каждую точку следует вводить  
**по 1,0–5,0 ЕД**

---

Общее количество введенного  
препарата РЕЛАТОКС®  
при коррекции тяжей платизмы  
**не должно превышать 40 ЕД**

Platysma

